



Coronaprikken voor mensen met een (ernstige) afweerstoornis

Sommige mensen met een (ernstige) afweerstoornis hebben extra prikken tegen corona nodig. Zo kunnen zij zich beter beschermen tegen een besmetting met corona en tegen de ernstige gevolgen ervan, als ze toch besmet raken met corona.

Basisserie coronaprikken:

Mensen met een (ernstige) afweerstoornis krijgen een extra basisprik. Uit onderzoek blijkt namelijk dat niet iedereen voldoende bescherming heeft na 2 prikken, daarom krijgt deze groep mensen 3 basisprikken.


Extra coronaprikken:

De opgebouwde bescherming van de basisserie kan na verloop van tijd afnemen. Met extra coronaprikken kan de bescherming weer worden opgebouwd.

Basisserie coronaprikken



Extra coronaprikken



Tussentijd: minimaal 3 maanden na laatste prik of 3 maanden na besmetting met corona

Om wie gaat het

Patiënten onder behandeling van een medisch specialist voor:

- Orgaantransplantatie.
- Beenmerg- of stamceltransplantatie.
- Een hematologische ziekte onder (recente) actieve behandeling.
- Hematologische kanker waarbij een (ernstige) afweerstoornis ontstaat.
- Nierpatiënten (met eGFR <30ml/min^{1.73m2} met immunosuppressiva).
- Dialysepatiënten.
- Primaire immundeficiëntie, alleen als de arts dat nodig vindt (volgens de NIV criteria).
- Behandeling met specifieke immunosuppressiva (zie: rivm.nl/coronavaccinatie/afweerstoornis).
- Kankerpatiënten (solide tumoren) met chemotherapie of immuuntherapie. Zij krijgen de 5e prik alleen als de arts dat nodig vindt.
- Mensen met HIV, zij krijgen geen 3e prik, wel een herhaalprik.



Meer weten?

Kijk op onze website
rivm.nl/coronavaccinatie/afweerstoornis
of scan de QR-code.

